Continue

La diarrea puede ser un padecimiento grave. Si después de tomar durante dos días, este medicamento, en la forma indicada, los síntomas persisten sin alivio aparente o hay fiebre elevada, CONSULTE A SU MEDICO. Los ingredientes del producto pueden cambiar el color de las evacuaciones ennegreciéndolas: Este efecto no es en lo absoluto perjudicial y desaparece al dejar de tomar el medicamento. Imagen no disponible paraColor: Para ver la descarga de este video Flash Player Nombre generico: Bismuth Subsalicylate Clase de droga: Antidiarreicos Uso de Percy Medicine Percy Medicine alivia la diarrea, la diarrea del viajero, las náuseas, la acidez estomacal, la indigestión, los gases o el malestar estomacal. Percy Medicine también se puede utilizar para fines no mencionados en esta guía del medicamento. Busque ayuda médica de emergencia si tiene signos de una reacción alérgica: urticaria, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Percy Medicine puede causar efectos secundarios graves. Deje de usar Percy Medicine y llame a su médico de inmediato si tiene: cambios de comportamiento con náuseas y vómitos; pérdida de audición o zumbidos en los oídos; diarrea que dura más de 2 días; o empeoramiento de los síntomas estomacales. Percy Medicine puede provocar que usted tenga la lengua negra u oscurecida. Este es un efecto secundario inofensivo. Los efectos secundarios comunes incluyen: estreñimiento; o heces de color oscuro. Esta no es una lista completa de los efectos secundarios y pueden ocurrir otros. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088. antes de tomar Percy Medicine No debe usar Percy Medicine si es alérgico a él o si tiene:heces negras o con sangre; úlcera de estómago; problemas de sangrado; o si es alérgico a los salicilatos como la aspirina, Doan's Extra Strength, Salflex, Tricosal y otros. El uso de este medicamento en un niño o adolescente con síntomas de gripe o varicela puede causar una afección grave o mortal llamada síndrome de Reye.Pregunte a su médico o farmacéutico si es seguro usar este medicamento si tiene o alguna vez ha tenido:moco en las heces; o si actualmente tiene fiebre. Consulte a un médico antes de usar este medicamento si está embarazada o amamantando.No le dé este medicamento a un niño menor de 12 años sin consejo médico.Este medicamento puede contener fenilalanina y podría ser perjudicial si tiene fenilcetonuria (PKU). Relacionar drogas Cómo utilizar Percy Medicine Úselo exactamente como se indica en la etiqueta o según lo prescrito por su médico. Agite la suspensión oral (líquido). Mida una dosis con el dispositivo medidor suministrado (no con una cuchara de cocina). Debe masticar la tableta masticable antes de tragarla. Beba muchos líquidos mientras esté tomando Percy Medicine. . Tomar más de la dosis recomendada no hará que Percy Medicine sea más efectivo y puede causar efectos secundarios graves. Llame a su médico si todavía tiene diarrea después de 2 días de usar este medicamento. medicamento. Este medicamento puede afectar los resultados de ciertas pruebas médicas. Informe a cualquier médico que lo atienda que está usando Percy Medicine. Conserve a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor. No congelar. Advertencias No debe usar Percy Medicine si tiene problemas de sangrado, úlcera estomacal, sangre en las heces o si es alérgico a la aspirina u otros salicilatos. Usar este medicamento en un niño o adolescente con síntomas de gripe o varicela puede causar una afección grave o mortal llamada síndrome de Reye. ¿Qué otras drogas afectarán? Percy Medicine Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar Percy Medicine con cualquier otro medicamento, especialmente: medicamento para la artritis; gota medicamentos; insulina o medicamentos orales para la diabetes; o un anticoagulante: warfarina, Coumadin, Jantoven. Esta lista no está completa. Otras drogas pueden afectar a Percy Medicine, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y productos herbales. No todas las posibles interacciones medicamentosas se enumeran aquí. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información proporcionada por Drugslib.com sea precisa, hasta -fecha y completa, pero no se ofrece ninguna garantía a tal efecto. La información sobre medicamentos contenida en este documento puede ser urgente. La información de Drugslib.com ha sido compilada para uso de profesionales de la salud y consumidores en los Estados Unidos y, por lo tanto, Drugslib.com no garantiza que los usos fuera de los Estados Unidos sean apropiados, a menos que se indique específicamente lo contrario. La información sobre medicamentos de Drugslib.com no respalda medicamentos, ni diagnostica a pacientes ni recomienda terapias. La información sobre medicamentos de Drugslib.com es un recurso informativo diseñado para ayudar a los profesionales de la salud autorizados a cuidar a sus pacientes y/o para servir a los consumidores que ven este servicio como un complemento y no un sustituto de la experiencia, habilidad, conocimiento y criterio de la atención médica. practicantes. La ausencia de una advertencia para un determinado medicamento o combinación de medicamentos de ninguna manera debe interpretarse como una indicación de que el medicamento o la combinación de medicamentos es seguro, eficaz o apropiado para un paciente determinado. Drugslib.com no asume ninguna responsabilidad por ningún aspecto de la atención médica administrada con la ayuda de la información que proporciona Drugslib.com. La información contenida en este documento no pretende cubrir todos los posibles usos, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones medicamentosas, reacciones alérgicas o efectos adversos. Si tiene preguntas sobre los medicamentos que está tomando, consulte con su médico, enfermera o farmacéutico. Palabras clave populares Código de Barras: 7501422100017Atención personalizada de 8:00 a 22:00 hrs a través de Call Center 6-9 años: 2/3 comprimido; repita la dosis según se requiera cada 1/2 a 1 h.; usar hasta que se interrumpa la diarrea pero no por más de 2 días. Tabletas masticables: Ads 2 tabletas; niños: de 9 a 12 años: 1 tableta; la dosis se repite cada 3 h.; mastíquese, no se trague. ¿Qué cura el bebé Percy? Bismuth subsalicylate se usa para tratar diarrea, náusea, acidez del estómago, indigestión, gas, o malestar estomacal. ¿Qué contiene el medicamento Percy? Medicina Percy Suspensión Caja Con Frasco Con 90 mL. Presentación en caja con frasco con 90 mL. Contiene: Subsalicilato de bismuto. Dosis: La que el médico señale. ¿Dónde consigo medicina Percy? Farmacias Klyns – Medicina Percy de 90 ml. ¿Cuánto cuesta subsalicilato de bismuto? $49.00 ¿Dónde puedo conseguir el bismuto? Farmacias del Ahorro | Marca del Ahorro Bismuto Subsalicilato 118 ml liq | Tienda en línea a todo México. ¿Cómo dar bismuto a un niño? Adultos: la dosis recomendada es de 524 mg de subsalicilato de bismuto (2 comprimidos masticables) cada 30-60 minutos. No exceder las 8 dosis/día. Niños de 9-12 años: 262 mg (1 comprimido) cada 30-60 minutos. No exceder las 8 dosis/día. ¿Qué precio tiene el Itamol? Precio: $36.00 *El precio de este producto es sugerido por lo que puede variar de acuerdo a la zona geográfica de la sucursal. ¿Cómo se toma el Itamol? ITAMOL Dosis y vía de administración: Oral. Adultos: 2 tabletas. Niños de 9 a 12 años: 1 tableta. Niños de 6 a 9 años: 2/3 de tableta. ¿Cuántos días se puede tomar bismutol? Posología Oral. Tabletas: Ads, 2 comprimidos; niños de 9- 12 años: 1 comp. 6-9 años: 2/3 comprimido; repita la dosis según se requiera cada 1/2 a 1 h.; usar hasta que se interrumpa la diarrea pero no por más de 2 días. ¿Cómo conservar crema de bismuto? Conservar en lugar fresco. MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ¿Qué pasa si tomo crema de bismuto vencida? Si me tomo una medicina vencida me puede pasar algo malo «Generalmente no le sucede nada», indica el profesor. «Si una persona toma un medicamento vencido unos pocos días después de que la fecha de caducidad haya pasado, no le va a pasar nada». ¿Qué pasa si me pongo una crema vencida en la cara? Además de que estéticamente podemos empeorar el aspecto de nuestro maquillaje, los cosméticos caducados pueden dañar la piel: irritación, dermatitis de contacto o eczemas son las consecuencias más visibles. “La fecha de caducidad de un cosmético es variable según el producto”, apunta la maquilladora. ¿Cuánto tiempo dura una crema para el cuerpo? Las cremas y los desmaquillantes duran de seis meses a un año normalmente y los perfumes, hasta tres. Uxío Da Vila. Desmaquillantes, mascarillas y bálsamos labiales. De seis meses a un año porque sus fórmulas son más sensibles y con más ingredientes naturales habitualmente.